Fall 1

Stabiler Patient mit respiratorischem Infekt (Husten, Fieber, etc.) **ohne Hinweis auf CoV-Infektion** (d.h. kein Aufenthalt in Risikogebiet; kein Kontakt zu bestätigtem CoV-Fall bis max. 14 Tage vor Erkrankungsbeginn)

Maßnahmen:

1. Mund-Nasenschutz fakultativ (normal)
2. Ambulante Behandlung
3. Keine Testung

*RF bzw. Risikofaktoren: Immunsuppression, relevante chronische Erkankungen, hohes Alter, Schwangerschaft etc.

Fall 2

Stabiler Patient mit **V.a. CoV-Infektion**, d.h. respiratorischer Infekt

UND

Kontakt zu bestätigtem CoV-Fall **oder**

Aufenthalt in einem Risikogebiet den letzten 2 Wochen

1. Mund-Nasenschutz für Patient **und** FFP2 für Mitarbeiter sowie Einmalschutzkittel, Handschuhe, Schutzbrille
2. Betreuung/Behandlung
   - Milde Verlaufsform/keine RF*/compliant → ambulant
   - ausgeprägte Klinik/RF*/multimorbide → stationär
3. Virologische Testung
   - milde Klinik → Testung nur auf Corona
   - ausgeprägte Klinik → Testung auf Corona und Influenza
4. Meldepflicht Gesundheitsamt
5. Information an Hausarzt und Patient

Fall 3

Instabiler Patient: Bestätige CoV-Infektion oder hochgradiger V.a. CoV **plus** respiratorische Insuffizienz

↓

Aufnahme auf **Intensivstation** und entsprechende Diagnostik / Therapie

Risikogebiete

In China: Provinz Hubei (inkl. Stadt Wuhan) und die Städte Wenzhou, Hangzhou, Ningbo, Taizhou in der Provinz Zhejiang.

Im Iran: Provinz Ghom

In Italien: Region Emilia-Romagna, Region Lombardei und die Stadt Vo in der Provinz Padua in der Region Venetien.

In Südkorea: Provinz Gyeongsangbuk-do (Nord-Gyeongsang)